



生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説 第5集におけるお詫びと訂正

2024年4月10日に発行されました生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説 第5集につきまして、誤植及び訂正箇所がございました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正内容を以下の通りお知らせいたします。

一般社団法人日本内科学会 セルフトレーニング問題作成委員会

【正誤訂正表】

該当頁	該当箇所	誤	正																																																																																																																														
P,569	26行目	× (c) 診断した医師が、直ちに	× (c) 診断した医師が、 <u>7日以内に</u>																																																																																																																														
P,682	1行目	解答：(d)	解答：(c)																																																																																																																														
P,158	問題 184 図 No.1	胸部 X 線写真 	胸部 X 線写真 																																																																																																																														
P,345	問題 52 表 No.2 RIPASA スコア	<p>RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) スコア</p> <table border="1"> <tr><td>性別</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>女性</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>男性</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>年齢</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>≤40</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>>40</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>シンガポールまたはインド国籍ではない</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>右下腹部痛</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部への痛みの移動</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>食欲不振</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>悪心・嘔吐</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>症状持続時間</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>≤48時間</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>>48時間</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部の圧痛</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>筋性防御</td><td></td><td>+2</td></tr> <tr><td>反跳痛</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>Rovsing徴候</td><td></td><td>+2</td></tr> <tr><td>体温 37~39°C</td><td></td><td>+2</td></tr> <tr><td>白血球増多</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>血尿、濃尿、細菌尿がない</td><td></td><td>+1</td></tr> </table>	性別			女性		+0.5	男性		+1	年齢			≤40		+1	>40		+0.5	シンガポールまたはインド国籍ではない		+1	右下腹部痛		+0.5	右下腹部への痛みの移動		+0.5	食欲不振		+1	悪心・嘔吐		+1	症状持続時間			≤48時間		+1	>48時間		+0.5	右下腹部の圧痛		+1	筋性防御		+2	反跳痛		+1	Rovsing徴候		+2	体温 37~39°C		+2	白血球増多		+1	血尿、濃尿、細菌尿がない		+1	<p>RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) スコア</p> <table border="1"> <tr><td>性別</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>女性</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>男性</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>年齢</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>≤40</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>>40</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>シンガポールまたはインド国籍ではない</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>右下腹部痛</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部への痛みの移動</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>食欲不振</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>悪心・嘔吐</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>症状持続時間</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>≤48時間</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>>48時間</td><td></td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部の圧痛</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>筋性防御</td><td></td><td>+2</td></tr> <tr><td>反跳痛</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>Rovsing徴候</td><td></td><td>+2</td></tr> <tr><td>体温 37~39°C</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>白血球増多</td><td></td><td>+1</td></tr> <tr><td>血尿、濃尿、細菌尿がない</td><td></td><td>+1</td></tr> </table>	性別			女性		+0.5	男性		+1	年齢			≤40		+1	>40		+0.5	シンガポールまたはインド国籍ではない		+1	右下腹部痛		+0.5	右下腹部への痛みの移動		+0.5	食欲不振		+1	悪心・嘔吐		+1	症状持続時間			≤48時間		+1	>48時間		+0.5	右下腹部の圧痛		+1	筋性防御		+2	反跳痛		+1	Rovsing徴候		+2	体温 37~39°C		+1	白血球増多		+1	血尿、濃尿、細菌尿がない		+1
性別																																																																																																																																	
女性		+0.5																																																																																																																															
男性		+1																																																																																																																															
年齢																																																																																																																																	
≤40		+1																																																																																																																															
>40		+0.5																																																																																																																															
シンガポールまたはインド国籍ではない		+1																																																																																																																															
右下腹部痛		+0.5																																																																																																																															
右下腹部への痛みの移動		+0.5																																																																																																																															
食欲不振		+1																																																																																																																															
悪心・嘔吐		+1																																																																																																																															
症状持続時間																																																																																																																																	
≤48時間		+1																																																																																																																															
>48時間		+0.5																																																																																																																															
右下腹部の圧痛		+1																																																																																																																															
筋性防御		+2																																																																																																																															
反跳痛		+1																																																																																																																															
Rovsing徴候		+2																																																																																																																															
体温 37~39°C		+2																																																																																																																															
白血球増多		+1																																																																																																																															
血尿、濃尿、細菌尿がない		+1																																																																																																																															
性別																																																																																																																																	
女性		+0.5																																																																																																																															
男性		+1																																																																																																																															
年齢																																																																																																																																	
≤40		+1																																																																																																																															
>40		+0.5																																																																																																																															
シンガポールまたはインド国籍ではない		+1																																																																																																																															
右下腹部痛		+0.5																																																																																																																															
右下腹部への痛みの移動		+0.5																																																																																																																															
食欲不振		+1																																																																																																																															
悪心・嘔吐		+1																																																																																																																															
症状持続時間																																																																																																																																	
≤48時間		+1																																																																																																																															
>48時間		+0.5																																																																																																																															
右下腹部の圧痛		+1																																																																																																																															
筋性防御		+2																																																																																																																															
反跳痛		+1																																																																																																																															
Rovsing徴候		+2																																																																																																																															
体温 37~39°C		+1																																																																																																																															
白血球増多		+1																																																																																																																															
血尿、濃尿、細菌尿がない		+1																																																																																																																															
P,634	問題 282 選択肢考察	<p>× (c) 爪上皮出血点は…</p> <p>× (d) Gottron 徴候は…</p>	<p>× (c) Gottron 徴候は…</p> <p>× (d) 爪上皮出血点は…</p> <p style="text-align: right;">2024年11月訂正</p>																																																																																																																														

P,504	問題 184 10 行目	眼瞼下垂（上眼瞼挙筋障害）	眼瞼下垂（ミユラー筋障害） 2025 年 3 月訂正
-------	-----------------	---------------	-------------------------------