


生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説 第5集におけるお詫びと訂正

2024年4月10日に発行されました生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説 第5集につきまして、誤植及び訂正箇所がございました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正内容を以下の通りお知らせいたします。

一般社団法人日本内科学会 セルフトレーニング問題作成委員会

【正誤訂正表】

該当頁	該当箇所	誤	正																																																																																				
P,569	26 行目	× (c) 診断した医師が, <u>直ちに</u>	× (c) 診断した医師が, <u>7 日以内に</u>																																																																																				
P,682	1 行目	解答 : (d)	解答 : (c)																																																																																				
P,158	問題 184 図 No.1	胸部 X 線写真 	胸部 X 線写真 																																																																																				
P,345	問題 52 表 No.2 RIPASA スコア	RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) スコア <table><tr><td>性別</td><td></td></tr><tr><td>女性</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>男性</td><td>+1</td></tr><tr><td>年齢</td><td></td></tr><tr><td>≤40</td><td>+1</td></tr><tr><td>>40</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>シンガポールまたはインド国籍ではない</td><td>+1</td></tr><tr><td>右下腹部痛</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>右下腹部への痛みの移動</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>食欲不振</td><td>+1</td></tr><tr><td>悪心・嘔吐</td><td>+1</td></tr><tr><td>症状持続時間</td><td></td></tr><tr><td>≤48時間</td><td>+1</td></tr><tr><td>>48時間</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>右下腹部の圧痛</td><td>+1</td></tr><tr><td>筋性防御</td><td>+2</td></tr><tr><td>反跳痛</td><td>+1</td></tr><tr><td>Rovsing徴候</td><td>+2</td></tr><tr><td>体温 37~39°C</td><td>+2</td></tr><tr><td>白血球増多</td><td>+1</td></tr><tr><td>血尿、濃尿、細菌尿がない</td><td>+1</td></tr></table>	性別		女性	+0.5	男性	+1	年齢		≤40	+1	>40	+0.5	シンガポールまたはインド国籍ではない	+1	右下腹部痛	+0.5	右下腹部への痛みの移動	+0.5	食欲不振	+1	悪心・嘔吐	+1	症状持続時間		≤48時間	+1	>48時間	+0.5	右下腹部の圧痛	+1	筋性防御	+2	反跳痛	+1	Rovsing徴候	+2	体温 37~39°C	+2	白血球増多	+1	血尿、濃尿、細菌尿がない	+1	RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) スコア <table><tr><td>性別</td><td></td></tr><tr><td>女性</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>男性</td><td>+1</td></tr><tr><td>年齢</td><td></td></tr><tr><td>≤40</td><td>+1</td></tr><tr><td>>40</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>シンガポールまたはインド国籍ではない</td><td>+1</td></tr><tr><td>右下腹部痛</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>右下腹部への痛みの移動</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>食欲不振</td><td>+1</td></tr><tr><td>悪心・嘔吐</td><td>+1</td></tr><tr><td>症状持続時間</td><td></td></tr><tr><td>≤48時間</td><td>+1</td></tr><tr><td>>48時間</td><td>+0.5</td></tr><tr><td>右下腹部の圧痛</td><td>+1</td></tr><tr><td>筋性防御</td><td>+2</td></tr><tr><td>反跳痛</td><td>+1</td></tr><tr><td>Rovsing徴候</td><td>+2</td></tr><tr><td>体温 37~39°C</td><td>+1</td></tr><tr><td>白血球増多</td><td>+1</td></tr><tr><td>血尿、濃尿、細菌尿がない</td><td>+1</td></tr></table>	性別		女性	+0.5	男性	+1	年齢		≤40	+1	>40	+0.5	シンガポールまたはインド国籍ではない	+1	右下腹部痛	+0.5	右下腹部への痛みの移動	+0.5	食欲不振	+1	悪心・嘔吐	+1	症状持続時間		≤48時間	+1	>48時間	+0.5	右下腹部の圧痛	+1	筋性防御	+2	反跳痛	+1	Rovsing徴候	+2	体温 37~39°C	+1	白血球増多	+1	血尿、濃尿、細菌尿がない	+1
性別																																																																																							
女性	+0.5																																																																																						
男性	+1																																																																																						
年齢																																																																																							
≤40	+1																																																																																						
>40	+0.5																																																																																						
シンガポールまたはインド国籍ではない	+1																																																																																						
右下腹部痛	+0.5																																																																																						
右下腹部への痛みの移動	+0.5																																																																																						
食欲不振	+1																																																																																						
悪心・嘔吐	+1																																																																																						
症状持続時間																																																																																							
≤48時間	+1																																																																																						
>48時間	+0.5																																																																																						
右下腹部の圧痛	+1																																																																																						
筋性防御	+2																																																																																						
反跳痛	+1																																																																																						
Rovsing徴候	+2																																																																																						
体温 37~39°C	+2																																																																																						
白血球増多	+1																																																																																						
血尿、濃尿、細菌尿がない	+1																																																																																						
性別																																																																																							
女性	+0.5																																																																																						
男性	+1																																																																																						
年齢																																																																																							
≤40	+1																																																																																						
>40	+0.5																																																																																						
シンガポールまたはインド国籍ではない	+1																																																																																						
右下腹部痛	+0.5																																																																																						
右下腹部への痛みの移動	+0.5																																																																																						
食欲不振	+1																																																																																						
悪心・嘔吐	+1																																																																																						
症状持続時間																																																																																							
≤48時間	+1																																																																																						
>48時間	+0.5																																																																																						
右下腹部の圧痛	+1																																																																																						
筋性防御	+2																																																																																						
反跳痛	+1																																																																																						
Rovsing徴候	+2																																																																																						
体温 37~39°C	+1																																																																																						
白血球増多	+1																																																																																						
血尿、濃尿、細菌尿がない	+1																																																																																						
P,634	問題 282 選択肢考察	× (c) 爪上皮出血点は… × (d) Gotttron 徴候は…	× (c) Gotttron 徴候は… × (d) 爪上皮出血点は… 2024 年 11 月訂正																																																																																				

P,504	問題 184 10 行目	眼瞼下垂 (<u>上眼瞼挙筋障害</u>)	眼瞼下垂 (<u>ミューラー筋障害</u>) 2025 年 3 月訂正
P,575	問題 236 3 行目	正中神経の <u>主根幹部</u> での	正中神経の <u>手根管部</u> での 2025 年 7 月訂正
P,656	問題 303 13 行目	× (d) シマイエ蚊は、 <u>国内では日本脳炎な どの媒介生物として知られる。三日熱マラリ アは、ハマダラ蚊により媒介される。</u>	× (d) シマイエ蚊は、 <u>ヒトスジシマ蚊を指 す。国内でデング熱を媒介したことで知られ る。シマイエ蚊 (ヒトスジシマ蚊)はデング 熱、ジカ熱、チクングンヤ熱の媒介生物として 知られる。</u> 2025 年 7 月訂正